

GRANULOVANÁ VOSKOVANÁ POŽEROVÁ NÁSTRAHA NAČERVENALÉ BARVY URČENÁ K HUBENÍ POTKANŮ, KRYŠ, MYŠÍ DOMÁCÍCH, HRYZCE VODNÍHO A DALŠÍCH DROBNÝCH HLODAVCŮ V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH (JAKO JSOU CHATY, KOLNY, BYTOVÉ JEDNOTKY, SKLEPY, PŮDY) NEBO V JEJICH TĚSNÉ BLÍZKOSTI.

Účinná látka: **0,005 % antikoagulant brodifacoum** 3-(3-[4'-brom-1, 1'-bifenyl-4-yl]-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenyl)-4-hydroxybenzopyran-2-on **99,995 %** atraktivního nástrahového materiálu včetně sušené mrkve.

Brodifacoum: Číslo ES (EINECS): 0259-980-5, číslo CAS: 056073-10-0

Přípravek obsahuje hořké činidlo, které působí jako chuťový odpuzovač pro člověka. Parafinový obal zaručuje delší trvanlivost nástrahy ve vlhkých podmínkách.

POZOR! Obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum! Ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi! Uchovávejte mimo dosah dětí! (S2)

Nevykládejte na místa, která jsou snadno dosažitelná pro domácí nebo hospodářská zvířata!

Pro domácí zvířata a ryby jedovatý!

Přípravek nesmí být použit ve volné přírodě!

Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu na použití!

Mechanismus účinku: Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje propustnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne vnitřním vykrvácením. **NORAT ATG** působí již jednorázovým použitím (po několika granulích), je velmi dobře přijímán a úhyn nastává mezi 3.-10. dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky. Nástraha nevyvolává obranný reflex.

Návod na použití: Nástrahu v uvedeném množství nasypte pomocí lžičky k tomu určené k dřám, norám nebo na místa nejvíce navštěvovaná hlodavci, případně do jedových staniček, uzavřených bedniček s otvory, drenážních trubek nebo skrytě za cihlu nebo jiný materiál, abychom zabránili styku nástrahy s necílovými organismy, zejména dětmi a domácími zvířaty. Účinnější a hospodárnější je vykládat po asanované ploše větší množství menších hromádek nebo větší počet jedových staniček než naopak. Nástrahy doplňujte vždy za 8–10 dnů, a to tak dlouho, dokud trvá jejich odběr.

Norat ATG lze používat v potravinářských provozech na základě vyjádření ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno ze dne 9.1.2004 číslo 2/04

Dávkování:

Hubení potkanů, kryš: **10 - 15** granulí na několik míst
Hubení myši domácích: **3 - 5** granulí na několik míst
Hubení hryzce vodního: **1 - 2** granule na několik míst

NORAT ATG

10 kg



GRANULOVANÁ VOSKOVANÁ POŽEROVÁ NÁSTRAHA K JEDNORÁZOVÉMU HUBENÍ POTKANŮ, KRYŠ, HRYZCŮ VODNÍCH A MYŠÍ DOMÁCÍCH

Obsahuje:
50 mg brodifacoumu
v 1 kg přípravku

Biocidní přípravek podle zákona č. 120/2002 Sb. určený pro profesionální použití i malospotřebitelský sektor.



Bezpečnostní opatření: Při práci s nástrahou používejte ochranný oděv, gumové rukavice a boty (**S36/37/39**). Při práci není dovoleno jíst, pít nebo kouřit (**S20/21**). Po práci a před jídlem se důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem.

Příznaky otravy: Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

První pomoc:

Při náhodném požití: vypít 1/2 litru vlažné vody s 10 tabletami medicínálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení, nejdéle do 10 minut.

Při zasažení pokožky: odstranit kontaminovaný oděv (**S27**), důkladně se omýt tekoucí vodou a mýdlem (**S28**).

Při zasažení očí: vyplachovat proudem čisté tekoucí vody po dobu 5-10 minut.

Při nadýchání prachu: přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. **ANTIDOTEM** proti působení brodifacoumu je vitamin K1-Kanavit. Jeho dávku určí vždy lékař. Léčbu postiženého lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika nemocí z povolání

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Telefon: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

e-mail: tis@mbox.cesnet.cz

Skládání přípravku: Norat ATG se skladuje v původních neporušených obalech (**S49**) odděleně od potravin, krmiv (**S13**), hnojiv a různých aromatických látek včetně pesticidů, aby nástrahy nepřejaly zápach, čímž by mohly ztratit svoji atraktivitu pro hlodavce. Nástrahy chraňte před přímým slunečním světlem a vlhkem. Skladujte v pevně uzavřeném obalu při teplotě +5 - 40 °C (**S7/47**). Obal znovu nepoužívat.

Likvidace obalů: Prázdné obaly před likvidací znehodnoťte a pak likvidujte v komunálním odpadu.

Registrant: TransChem s.r.o., Pod Strašnickou vinicí 12, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 770 063, 602 219 959, Fax: 274 783 078

Výrobce: TransChem Professional B.V. Holandsko, ve spolupráci s Agrochemou družstvo Studenec



Doba použitelnosti: Při předepsaném způsobu skladování je doba použitelnosti 36 měsíců od data výroby.

Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu

Datum výroby: uvedeno na obalu

PŘÍPRAVEK NENÍ KLASIFIKOVÁN A NENÍ NEBEZPEČNÝ PRO PŘEPRAVU

Velikost balení: 10 kg

NORAT je registrovaná ochranná známka firmy TransChem Professional B.V. Holandsko

**Přípravek povolen Ministerstvem zdravotnictví
REG - 3371-07.05.03/12565**

ETIKETA NORAT ATG10 2006-07-03

