

RODENTICIDNÍ PŘÍPRAVEK – GRANULOVANÁ, MODŘE ZBARVENÁ POŽEROVÁ NÁSTRAHA K HUBENÍ VŠECH DRUHŮ ŠKODLIVÝCH HLODAVCŮ UVNITŘ A VNĚ OBJEKTŮ. JE TVOŘENA SMĚSÍ CEREÁLÍ, CUKRU, PROTEINŮ A TUKU S PŘÍDÁNÍM DOCHUCOVADEL PRO ZVÝŠENÍ JEJÍ PALATABILITY PRO HLODAVCE.

PŘÍPRAVEK OBSAHUJE HOŘKÉ ČINIDLO - CHUŤOVÝ ODPUZOVAČ PRO ČLOVĚKA.

PŘÍPRAVEK NENÍ KLASIFIKOVANÝ A NENÍ NEBEZPEČNÝ PRO PŘEPRÁVU.

Složení:

Účinná látka: 0.005% difenacoum (50 mg v 1 kg přípravku)
tj. 3-[3-(4'-bifenyl-4yl)-1,2,3,4 tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on
ES číslo: 0259-978-4
CAS číslo: 056073-07-5
Indexové číslo: 607-157-00-X

0.001% denatonium benzonát

hořká chuťová složka zmírňující riziko nežádoucího požití

99,994% atraktivní nástrahový materiál

- S2** Uchovávejte mimo dosahu dětí
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5 až 40°C
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S49 Uchovávejte pouze v původním obalu

POZOR!

Přípravek obsahuje zdraví škodlivý difenacoum!
Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata, ale i ptáky a divoce žijící zvířata!
Nutná ochrana vodních zdrojů!
Ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi!
Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob!
Zákaz používání přípravku ve volné přírodě!
Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití!
Před použitím přečtěte návod k použití!

Mechanismus účinku:

Difenacoum patří mezi antikoagulační jedy. Při požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje propustnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky. Úhyn nastává se zpožděním (až 2 týdnů) po přijetí letální dávky a protože nástraha nevaruje, bylo by častější vykládání nástrah plýtváním. K úhynu potkana dochází po konzumaci asi 15 g přípravku, u myši s nižší hmotností cca 3 g. Během maximálně 4-6 týdnů je hubení dokončeno.

Návod na použití:

Nástrahy se vykládají do míst, která jsou nejvíce navštěvována hlodavci (do děr, nor, skrýší podél stezek apod.). V místech, která nejsou přirozeně chráněna, používejte jedové staničky.

Zásadou je rozmístění nástrah na více místech, a to i tam, kde je předpokládán největší výskyt, tj. do děr, nor a skrýší, podél stezek. Mimo míst, která jsou přirozeně chráněna (nutno zabránit tomu, aby nástrahu nezkonzumovala volně se pohybující domácí zvířata, případně děti), je doporučeno používat dostupné jedové staničky, tj. uzavřené bedničky s vhodnými otvory a nejsou-li tyto k dispozici, pak nutno klást např. do kusů drenážních trubek, pod příklop z improvizovaného kusu krytiny, prkna, pod desku, plech o vhodné váze.

V případě deratizační akce v městských aglomeracích je nutné před akcí provést důkladnou očistu areálu ve smyslu odstranění volně dostupných potravinových zdrojů. Ošetřené areály se označí výstražnými nápisy. Nástrahy kontrolujeme a případně doplňujeme i během prvních 10-14 dnů, a to tak dlouho, pokud trvá jejich odběr. Po ukončení akce, tj. po 4-6 týdnech, je nutné odstranit zbytky nástrah. Zbytky se zpětně používají ke kladení nástrah. Úhynulá zvířata se zakopají na vyhrazeném místě.

Upozornění: Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat (viz kapitola skladování).

ROBAN lze použít v potravinářských provozech na základě stanoviska Ústavu pro státní kontrolu veterinárních preparátů a léčiv Brno ze dne 2.10.2009 pod čj. 86/2009

Dávkování:

Potkani, krysy: 180 g ve vzdálenosti 10 m, při velkém výskytu 5 m.

Myši: 30 g ve vzdálenosti 5 m, při velkém výskytu 2 m.

ROBAN

Granule



10 kg

Rodenticid - granule pro přímé použití

Biocidní přípravek podle zákona č. 120/2002 Sb. s účinnou látkou difenacoum

Bezpečnostní opatření:

Při práci s rodenticidem **ROBAN** není dovoleno jíst, pít a kouřit. Během práce je nutno používat osobní, ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, gumové rukavice a kožené nebo gumové boty). Po práci a při každém přerušení práce je nutno si omýt ruce vodou a mýdlem.

Příznaky otravy a první pomoc:

Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

První pomoc:

Při náhodném požití: vypít 1/2 litru vlažné vody s 10 tabletami mediálního uhlí a dráždním hrdla vyvolat zvracení, nejdéle do 10 minut. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat tento obal.

Při zasažení očí: vymývat proudem čisté vody po dobu 5 -10 minut a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo vodou a mýdlem.

Při nadýchání prachu: přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. ANTI-DOTEM proti působení difenacoumu je vitamin K1-KANAVIT. Jeho dávku určí lékař. Léčbu postiženého je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika nemoci z povolání

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
E-mail: tis@cesnat.cz

Skladování:

ROBAN se skladuje na bezpečném místě v původních obalech, v uzamykatelných skladištích odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek, od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani místnosti, kde byly pesticidy dříve skladovány. Přejatý zápach by mohl působit repelentně na hlodavce. Chraňte nástrahy před přímým slunečním světlem a hlavně vlhkem, aby se granule nerozpadávaly. Skladujte při teplotě + 5 až 40°C.

Spalitelný přípravek. Eventuální požár se likviduje hasební pěnou, práškem, eventuálně pískem nebo zemínou. Nesmí být použita voda, s výjimkou jemného zmlžování pro ochlazení materiálu v blízkosti požáru a pouze za předpokladu, že je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména, aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

Důležité upozornění:

Při požáru musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických látek nebo zplodin.

Likvidace obalů:

Prázdné plastové soudky a polyethylenové sáčky (po důkladném vyklepání) lze likvidovat v komunálním odpadu nebo pak spálením. Popel se překryje zemínou na takovém místě, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových a spodních vod.

Doba použitelnosti:

minimálně 3 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Dodavatel/držitel povolení:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 770 944, 274 770 063,
776 337 742, 602 219 959
Fax: 274 770 944, 274 783 078
E-mail: info@pelgar.cz



Výrobce:

Pro PelGar s.r.o.
vyrábí a balí:
AGROCHEMA družstvo STUDENEC
675 02 Koněšín, okres Třebíč.

ROBAN je povolen MZ pod čj. 31747/2009-SOZ-33.5.- 14.7.2009.

ROBAN je registrovanou ochrannou známkou firmy PelGar International Ltd., Velká Británie.
Bezpečnostní list k přípravku je k dispozici u registranta, výrobce nebo distributora.

Hmotnost: 10 kg

Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby: uvedeno na obalu