

VANISH



SLUG PELLETS

JAK PŮSOBÍ METALDEHYD NA OSTATNÍ ŽIVOČICHY

Dostupné prameny z toxikologické literatury se shodují, že hodnoty letální dávky (LD50) nevybočují většinou z rozmezí 100-1000 mg metaldehydu na kilogram živé váhy. Při přepočtu těchto dat na finální přípravek Vanish Slug Pellets, je množství, která ohrožují přežití v 50% pravděpodobnosti, následující:

Druh	Dávky
Pes	velmi široké rozmezí nalezených hodnot ponejvíce v rozmezí 5-15 g/kilogram (extrémy jednotlivě od 2,5 g do 25 g podle druhu)
Kočka, myš	5 g / kg
Králík	7-31 g / kg

Nejohroženějším domácím zvířetem je pes!

Dostane-li se pes k neodborně aplikované nástraze (hromádka) může ji - i přes krajně hořkou chuť díky obsaženému repelentu - sežrat celou. Blíží-li se množství kritické dávce, zpravidla do 3 hodin, nastává neklid, nystagmus, mohutné slinění. Působí tuhnou končetiny a má nechut jít. Bez zákroku zvěrolékaře hrozí zvracení, průjem, dehydratace. V nejtěžších případech smrt nastane s křečemi a výpadkem dýchání po 4-24 hodinách.

Příznaky otravy:

Příznaky akutní otravy mají zpoždění od jedno do několika hodin. Prvními projevy bývá účinek na nervový systém – třes, stahy, ztráta paměti.

Při středních otravách se zvíře zotaví úplně asi po 3 týdnech. Proto je lépe předejít následkům včasným zásahem, kterým je veterinární výplach žaludku (po lehké anestézii nebo zklidnění), případně jen použití emetik – dle rozhodnutí zvěrolékaře.


Mezi odolné druhy vůči metaldehydu patří žížaly, brouci, včely, vodní organizmy, ptáci.

Studie Central Science Laboratory, Velká Británie, ukázaly, že ptákům, kterým byly přidávány k potravě granule na bázi metaldehydu, se neobjevily příznaky toxicity. I při malém výběru potravy se ptáci peletám vyhýbají.

PRO MINIMÁLNÍ HRANICI ÚHYNU BYLY DÁVKY PRO METALDEHYD STANOVOVÁNY A PRO PŘÍPRAVEK PŘEPOČTEM, ČINÍ:

Druh	dávky
Husy	> 20 g / kg
Kuřata	> 12,5 g / kg
Kachny	> 7,5 g / kg
Ovce	> 7,5 g / kg
Kozy	> 19,5 g / kg
Krávy	> 5 g / kg
Kůň	> 2,5 g / kg

Pro člověka přepočtem nutné počítat se stejnou dávkou.



A JAK SE CHOVÁ JEŽEK

Ježek je potencionálně možným konzumentem nevhodně aplikovaných návnad, případně přešel-li by na potravu výhradně ze zasažených plátků. LD50 pravděpodobně jako u ostatních malých savců. Studie zjistila, že ježci kmeni slimáky usmrčenými granulemi s obsahem metaldehydu, nevykazovali nepříznivé vlivy.

BALENÍ:

Vanish Slug Pellets je na trh dodáván v **200 g plastových lahvích** pro malospotřebitele a ve **25 kg propylenových pytlích** pro zemědělský sektor.

PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU VŽDY POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY NA ETIKETĚ !

POUŽÍVEJTE PESTICIDY BEZPEČNĚ A DLE INSTRUKCÍ NA SCHVÁLENÝCH ETIKETÁCH !

Bližší informace získáte u držitele registrace nebo distributora.

TRANSCHEM
PROFESSIONAL

Přípravek na trh uvádí:

TransChem s.r.o.

Pod Strašnickou vinicí 12, 100 00 Praha 10

Telefon: 274 770 063, 602 219 959, Fax: 274 783 078

E-mail: info@transchem.cz

Vanish je registrovaná ochranná známka TransChem Professional B.V., Holandsko.

